

P3 de Álgebra Linear I – 2008.2

Data: 14 de Novembro de 2008.

1) Decida se cada afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. Marque sua resposta no quadro a seguir com um **X A CANETA**

- Considere uma transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que existem vetores \vec{u} e \vec{w} que verificam

$$T(\vec{u}) = \vec{u} \quad \text{e} \quad T(\vec{w}) = -\vec{w},$$

isto é, \vec{u} é um autovetor associado ao autovalor 1 e \vec{w} é um autovetor associado ao autovalor -1 .

Então $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$ é um autovetor de T associado a $0 = 1 + (-1)$.

- Sejam A e B duas matrizes 2×2 que têm o mesmo traço, o mesmo determinante e o mesmo polinômio característico. Então as matrizes A e B são semelhantes.

- Seja A uma matriz 3×3 não inversível tal que 1 e 2 são autovalores de A . Então o traço de A é 3.

- Seja A uma matriz 3×3 diagonalizável. Então existe a matriz inversa A^{-1} de A .

- As matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

são semelhantes.

2)

Prova Tipo A:

- a) Considere a base ortonormal

$$\beta = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{3}{\sqrt{11}}, \frac{1}{\sqrt{11}} \right), \left(\frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{-2}{\sqrt{22}}, \frac{3}{\sqrt{22}} \right) \right\}$$

de \mathbb{R}^3

Determine a primeira coordenada do vetor

$$\vec{w} = (2, 3166, 1)$$

na base β .

Observação: as coordenadas dos vetores da base β e do vetor \vec{w} estão escritas na base canônica \mathcal{E} .

- b) Determine a inversa M^{-1} da matriz M ,

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{1}{\sqrt{11}} \\ \frac{3}{\sqrt{22}} & \frac{-2}{\sqrt{22}} & \frac{3}{\sqrt{22}} \end{pmatrix}.$$

Prova Tipo B:

- a) Considere a base ortonormal

$$\beta = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{3}{\sqrt{11}}, \frac{-1}{\sqrt{11}} \right), \left(\frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{-2}{\sqrt{22}}, \frac{-3}{\sqrt{22}} \right) \right\}$$

de \mathbb{R}^3

Determine a primeira coordenada do vetor

$$\vec{w} = (1, 5166, 2)$$

na base β .

Observação: as coordenadas dos vetores da base β e do vetor \vec{w} estão escritas na base canônica \mathcal{E} .

b) Determine a inversa M^{-1} da matriz M ,

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{3}{\sqrt{22}} & \frac{-2}{\sqrt{22}} & \frac{3}{\sqrt{22}} \\ \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{1}{\sqrt{11}} \end{pmatrix}.$$

Prova Tipo C:

a) Considere a base ortonormal

$$\beta = \left\{ \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{3}{\sqrt{11}}, \frac{1}{\sqrt{11}} \right), \left(\frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{-2}{\sqrt{22}}, \frac{3}{\sqrt{22}} \right) \right\}$$

de \mathbb{R}^3

Determine a primeira coordenada do vetor

$$\vec{w} = (1, 4166, 3)$$

na base β .

Observação: as coordenadas dos vetores da base β e do vetor \vec{w} estão escritas na base canônica \mathcal{E} .

b) Determine a inversa M^{-1} da matriz M ,

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{1}{\sqrt{11}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{3}{\sqrt{22}} & \frac{-2}{\sqrt{22}} & \frac{3}{\sqrt{22}} \end{pmatrix}.$$

Prova Tipo D:

a) Considere a base ortonormal

$$\beta = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{3}{\sqrt{11}} \right), \left(\frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{-2}{\sqrt{22}} \right) \right\}$$

de \mathbb{R}^3

Determine a primeira coordenada do vetor

$$\vec{w} = (5, 1, 7166)$$

na base β .

Observação: as coordenadas dos vetores da base β e do vetor \vec{w} estão escritas na base canônica \mathcal{E} .

b) Determine a inversa M^{-1} da matriz M ,

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{1}{\sqrt{11}} \\ \frac{3}{\sqrt{22}} & \frac{-2}{\sqrt{22}} & \frac{3}{\sqrt{22}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

3) Calcule a inversa da matriz A ,

Prova Tipo A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Prova Tipo B:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Prova Tipo C:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Prova Tipo D:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

4)

a) Considere a transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(v) = v \times (1, 1, 1).$$

Determine a matriz de T na base

$$\eta = \{(1, 1, 1), (1, 0, -1), (1, -2, 1)\}.$$

b) Determine **explicitamente** duas matrizes **não** diagonalizáveis B e C (**diferentes** $B \neq C$) tais que seus polinômios característicos sejam

$$p_B(\lambda) = p_C(\lambda) = \det(B - \lambda I) = \det(C - \lambda I) = (3 - \lambda)^3.$$

5) Considere a transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuja matriz na base canônica é

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & -2 \\ -2 & 12 & 6 \end{pmatrix}.$$

- a) Determine uma base β de autovetores de T .
- b) Determine a matriz E de T na base β .
- c) Encontre a matriz P de mudança de base da base de autovetores β para a base canônica.