Prova tipo C

P4 de Álgebra Linear I – 2003.2

Data: 1 de dezembro de 2003.
Horário: 17:05 – 18:55.

Nome:_____ Matrícula:_____
Assinatura:_____ Turma:_____

Questão	Valor	Nota	Revis.
1a	0.5		
1b	0.5		
1c	0.5		
1d	0.5		
2a	1.0		
2b	1.0		
2c	0.5		
2d	0.5		
3a	1.0		
3b	1.0		
4	1.0		
5	1.0		
6	1.0		
Total	10.0		

Instruções:

- **Não é permitido usar calculadora. Mantenha o celular desligado. Escreva de forma clara e legível.**
- **É proibido desgrampear a prova e as folhas de rascunho. Prova com folhas faltando ou rasuradas terá nota zero.**
- **V. somente deverá entregar este caderno com as respostas. Faça os cálculos nas folhas de rascunho.**

Revisão: Terça-feira, (2-12-03), sala e horário de aula

1) Considere o ponto $P = (2, 0, 1)$, a reta r de equação paramétrica

$$r\colon (2 - t, 1 + 3t, 1 + t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

a) Escreva r como intereseção de dois planos (equação cartesiana) ρ e α, ρ paralelo ao eixo $\mathbb{X}$ e α paralelo ao eixo $\mathbb{Y}$.

b) Determine a equação cartesiana do plano τ que contém a reta r e o ponto P.

c) Encontre, caso exista, o ponto R de interseção da reta r acima e da reta

$$r'\colon (2 + t, 3 - t, 1 - t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Caso o ponto não exista escreva *as retas são reversas.*

d) Calcule a distância d entre o ponto P e a reta r.

Respostas:

a) ρ: α:

b) τ:

c) $R =$

d) $d =$

2) Considere a base

$$\beta = \{u_1 = (0,1,1); u_2 = (1,1,1); u_3 = (1,1,0)\}$$

de $\mathbb{R}^3$ e a transformação linear T,

$$T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3,$$

definida como segue: dado um vetor w da forma

$$w = a\,u_1 + b\,u_2 + c\,u_3$$

temos

$$T(w) = (a + 2b + 3c)\,u_3.$$

a) Determine (explicitamente) a matriz $[T]_\beta$ de T na base β.

b) Determine (explicitamente) a matriz $[T]_\epsilon$ de T na base canônica.

c) Determine (explicitamente) a matriz $[M]$ de mudança de base da base β à base canônica.

d) Considere agora o plano $\pi\colon 2x - y - z = 0$ e a base ξ do plano π

$$\xi = \{(2,1,1); (0,1,1)\}.$$

Determine as coordenadas $(w)_\xi$ do vetor $w = (4,4,4)$ na base ξ.

Respostas:

2.a) $[T]_\beta = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$

2.b) $[T]_\epsilon = \begin{pmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{pmatrix}$

2.c) $[M] = \begin{pmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{pmatrix}$

2.d) $(w)_\xi =$

3) Considere a projeção P no plano π

$$\pi : x + y - 2z = 0$$

na direção do vetor v

$$v = (1, -1, 1).$$

a) Determine a matriz $[P]$ da projeção P na base canônica.

b) Encontre uma base β de $\mathbb{R}^3$ tal que a matriz $[P]_\beta$ na base β seja

$$[P]_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Respostas:

3.a) $[P] = \begin{pmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{pmatrix}$

3.b) $\beta = \{ \qquad \}$

4) Considere a matriz

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

Escolha qual das afirmações a seguir é verdadeira para que a matriz M **não seja diagonalizável**.

Marque com caneta no quadro abaixo sua resposta

Atenção: Use "não sei" caso você não saiba a resposta. Resposta errada vale -0.2 pontos.

$b = 2$ e $a = 1$	
$b = 3$ e $a = 1$	
$b = 2$ e $a = 2$	
$b = 0$ e a qualquer número real	
nenhuma, M é sempre diagonalizável	
todas as afirmações anteriores são falsas	
não sei	

5) Seja $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ uma transformação linear tal que a matriz $[T]_\epsilon$ de T na base canônica é simétrica. Sabendo que

- $T(1,2,1) = (2,4,2)$,
- todo vetor não nulo do plano $x + 2y + z = 0$ é um autovetor,
- o determinante de $[T]_\epsilon$ é 50, e
- o traço de $[T]_\epsilon$ é negativo.

Determine os autovalores de T com suas multiplicidades.

Resposta:

autovalores:

6) Considere a transformação linear T cuja matriz $[T]$ na base canônica é o produto das matrizes

$$[T] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

Escolha qual das afirmações a seguir é a verdadeira.

A transformação linear T é:

(a) A projeção ortogonal no plano $x + y = 0$ seguida do espelhamento no plano $x - y - 2z = 0$.

(b) A projeção ortogonal no plano $x + y = 0$ seguida do espelhamento no plano $x - y + z = 0$.

(c) A projeção ortogonal no plano $x + y = 0$ seguida do espelhamento no mesmo plano $x + y = 0$.

(d) A projeção ortogonal no plano $x - y - 2z = 0$ seguida do espelhamento no mesmo plano $x - y - 2z = 0$.

(e) A projeção ortogonal no plano $x-y-2z = 0$ seguido de de espelhamento no plano $x + y = 0$.

(f) A projeção ortogonal no plano $x-y-2z = 0$ seguido de de espelhamento no plano $x - y + z = 0$.

(g) O espelhamento no plano $x - y - 2z = 0$.

(h) A projeção ortogonal no plano $x - y - 2z = 0$.

(i) O espelhamento no plano $x + y = 0$.

(j) A projeção ortogonal no plano $x + y = 0$.

(k) A projeção ortogonal no plano $x - y + z = 0$ seguida do espelhamento no plano $x - y - 2z = 0$.

(l) A projeção ortogonal no plano $x-y+z=0$ seguido de de espelhamento no plano $x+z=0$.

(m) A projeção ortogonal no plano $x-y+z=0$ seguido de de espelhamento no mesmo plano $x-y+z=0$.

(n) Nenhuma das opções acima é verdadeira.

Resposta:

Marque com caneta no quadro abaixo sua resposta

Atenção: use "**N** = não sei" caso você não saiba a resposta.

a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**N**